

癌化学療法レジメン早見表（外科）乳がん

| 登録名                      | 投与薬剤     | 投与日                     | 投与量                       | 備考  |
|--------------------------|----------|-------------------------|---------------------------|---|
| 3Weekly Taxoter          | ドセタキセル   | DAY 1                   | 60 mg/m <sup>2</sup>      | 3週1コース  |
| Weekly Taxol             | パクリタキセル  | DAY 1, 8, 15            | 40~80 mg/m <sup>2</sup>   | 3週投与1週休薬 / 1クール                                 |
| 2Weekly Taxol            | パクリタキセル  | DAY 1, 15, 29, 43 . . . | 120 mg/m <sup>2</sup>     | 2週毎に可能な限り投与                                     |
| 3Weekly Taxol            | パクリタキセル  | DAY 1                   | 175 mg/m <sup>2</sup>     | 1週投与2週休薬 / 1クール                                 |
| dose-dense (DD) PTX      | パクリタキセル  | DAY 1                   | 175 mg/m <sup>2</sup>     | 2週1クール day2にヘクフィルグ*ラスチムあり                       |
| Weekly PTX (12連投)        | パクリタキセル  | DAY 1, 8, 15, 22...     | 80 mg/m <sup>2</sup>      | 全12回、休薬なし                                       |
| アブラキサン                   | アブラキサン   | DAY 1                   | 260 mg/m <sup>2</sup>     | 3週毎   |
| CPT-11 A法                | イリノテカン   | DAY 1, 8, 15            | 100 mg/m <sup>2</sup>     | 3週投与1週休薬 / 1クール                                 |
| ゲムシタビン（再発乳癌）             | ゲムシタビン   | DAY 1, 8                | 1250 mg/m <sup>2</sup>    | 2週投与1週休薬（3週1コース）                                |
| ロゼウス                     | ロゼウス     | DAY 1, 8                | 25 mg/m <sup>2</sup>      | 2週投与1週休薬  |
| CMF                      | メソトレキセート | DAY 1, 8                | 40 mg/m <sup>2</sup>      | 2週投与2週休薬 / 1クール                                 |
|                          | 5FU      | DAY 1, 8                | 500~600 mg/m <sup>2</sup> |   |
|                          | エンドキサンP錠 | DAY 1~14                | 100 mg p. o.              |   |
| CAF(妊婦用)                 | ドキシソルビシン | DAY 1                   | 50 mg/m <sup>2</sup>      | 3週 1クール   |
|                          | エンドキサン   |                         | 500 mg/m <sup>2</sup>     |   |
|                          | 5FU      |                         | 500 mg/m <sup>2</sup>     |   |
| EC                       | エピルビシン   | DAY 1                   | 90 mg/m <sup>2</sup>      | 1週投与2週休薬 / 1クール                                 |
|                          | エンドキサン   | DAY 1                   | 500~600 mg/m <sup>2</sup> |   |
| dose-dense (DD) EC       | エピルビシン   | DAY 1                   | 90 mg/m <sup>2</sup>      | 2週1クール day2にヘクフィルグ*ラスチムあり                       |
|                          | エンドキサン   | DAY 1                   | 500~600 mg/m <sup>2</sup> |   |
| FEC 100                  | エピルビシン   | DAY 1                   | 60~100 mg/m <sup>2</sup>  | 1週投与2週休薬 / 1クール                                 |
|                          | エンドキサン   |                         | 500 mg/m <sup>2</sup>     |   |
|                          | 5FU      |                         | 500 mg/m <sup>2</sup>     |   |
| TC                       | ドセタキセル   | DAY 1                   | 60~70 mg/m <sup>2</sup>   | 1週投与2週休薬（3週1コース）<br>術後adjuvantは4コース             |
|                          | エンドキサン   |                         | 500~600 mg/m <sup>2</sup> |   |
| AC                       | ドキシソルビシン | DAY 1                   | 60 mg/m <sup>2</sup>      | 1週投与2週休薬 / 3週1クール                               |
|                          | エンドキサン   | DAY 1                   | 600 mg/m <sup>2</sup>     |   |
| エリブリン                    | エリブリン    | DAY 1, 8                | 1.4 mg/m <sup>2</sup>     | 3週1コース  |
| アバスタチン<br>+パクリタキセル       | アバスタチン   | DAY 1, 15               | 10 mg/kg                  | 4週1コース（乳がんレジメン）                                 |
|                          | パクリタキセル  | DAY 1, 8, 15            | 40~80 mg/m <sup>2</sup>   |   |
| カペシタビン<br>+ドセタキセル        | カペシタビン   | DAY 1~14                | 1650 mg/m <sup>2</sup>    | 3週1コース  |
|                          | ドセタキセル   | DAY 1                   | 60mg/m <sup>2</sup>       |   |
| パクリタキセル<br>+ゲムシタビン       | パクリタキセル  | DAY 1                   | 175 mg/m <sup>2</sup>     | 2週投与1週休薬（3週1コース）                                |
|                          | ゲムシタビン   | DAY 1, 8                | 1250 mg/m <sup>2</sup>    |   |
| weekly77*ラキサン<br>+テセントリク | アブラキサン   | DAY 1, 8, 15            | 100 mg/m <sup>2</sup>     | 4週1クール<br>アブラキサン3週投与1週休薬<br>テセントリク隔週投与          |
|                          | テセントリク   | DAY 1, 15               | 840 mg/body               |   |
| トラスツズマブ                  | トラスツズマブ  | DAY 1, 8, 15, 22 . . .  | 初回 4mg/kg<br>2回目以降 2mg/kg | 1週間隔でできるところまで<br>使用量=（体重×2 or 4 mg/kg）/21 mg/mL |
| tri トラスツズマブ              | トラスツズマブ  | DAY 1, 22 . . .         | 初回 8mg/kg<br>2回目以降 6mg/kg | 3週 1クール   |

癌化学療法レジメン早見表（外科）乳がん

| 登録名                             | 投与薬剤    | 投与日   | 投与量                      | 備考   |
|---------------------------------|---------|---|--------------------------|--|
| トラスツズマブ<br>+Weekly Taxol        | トラスツズマブ | DAY 1, 8, 15, 22  | 2 mg/kg                  | loading dose (HER 初回 4 mg/kg)<br>トラスツズマブ毎週投与<br>パクリタキセル3週投与1週休薬 / 1クール                                   |
|                                 | パクリタキセル | DAY 1, 8, 15  | 40~80 mg/m <sup>2</sup>  |  |
| tri-トラスツズマブ<br>+Weekly Taxol    | トラスツズマブ | DAY 1   | 8 (6) mg/kg              | 3週1コース<br>トラスツズマブ: 初回 8mg/kg (90分) 2回<br>目以降 6mg/kg (30分)  |
|                                 | パクリタキセル | DAY 1, 8, 15  | 40~80 mg/m <sup>2</sup>  |  |
| tri-トラスツズマブ<br>+パクリタキセル         | トラスツズマブ | DAY 1   | 8 (6) mg/kg              | 3週1コース<br>トラスツズマブ: 初回 8mg/kg (90分) 2回<br>目以降 6mg/kg (30分)  |
|                                 | パクリタキセル |   | 175 mg/m <sup>2</sup>    |  |
| トラスツズマブ<br>+ロゼウス                | トラスツズマブ | DAY 1   | 6 mg/kg                  | loading dose (HER 初回 8 mg/kg)<br>トラスツズマブ3週毎<br>ロゼウス2週投与1週休薬 / 1クール                                       |
|                                 | ロゼウス    | DAY 1, 8  | 25 mg/m <sup>2</sup>     |  |
| トラスツズマブ<br>+アブラキサン              | トラスツズマブ | DAY 1, 8, 15, 22  | 2 mg/kg                  | loading dose (HER 初回 4 mg/kg)<br>トラスツズマブ毎週投与<br>アブラキサン (d1) 3週1クール                                       |
|                                 | アブラキサン  | DAY 1   | 260 mg/m <sup>2</sup>    |  |
| triトラスツズマブ<br>+ゲムシタビン           | トラスツズマブ | DAY 1   | 6mg/kg                   | loading dose (HER 初回 8 mg/kg)<br>トラスツズマブ3週毎<br>ゲムシタビン2週投与1週休薬 / 1クール                                     |
|                                 | ゲムシタビン  | DAY 1, 8  | 1000 mg/m <sup>2</sup>   |  |
| トラスツズマブ<br>+エリブリン               | トラスツズマブ | DAY 1   | 6 mg/kg                  | loading dose (HER 初回 8 mg/kg)<br>3週1クール  |
|                                 | エリブリン   | DAY 1, 8  | 1.4 mg/m <sup>2</sup>    |  |
| トラスツズマブ<br>+ドセタキセル              | トラスツズマブ | DAY 1   | 8 (6) mg/kg              | 3週1コース<br>トラスツズマブ 初回8mg/kg、2回目以降<br>6mg/kg   |
|                                 | ドセタキセル  |   | 60~75 mg/m <sup>2</sup>  |  |
| S-1<br>+トラスツズマブ                 | トラスツズマブ | DAY 1   | 6 mg/kg                  | 2週投与1週休薬 (3週1コース)  |
|                                 | S-1     | DAY 1~14  | 標準投与量                    |  |
| カペシタビン<br>+トラスツズマブ              | トラスツズマブ | DAY 1   | 7.5 mg/kg                | 2週投与1週休薬 (3週1コース)  |
|                                 | カペシタビン  | DAY 1~14  | 2000 mg/m <sup>2</sup>   |  |
| トラスツズマブ<br>+パクリタキセル<br>+カルボプラチン | トラスツズマブ | DAY 1   | 8 (6) mg/kg              | 3週1コース<br>トラスツズマブ: 初回 8mg/kg (90分) 2回<br>目以降 6mg/kg (30分)  |
|                                 | パクリタキセル |   | 175 mg/m <sup>2</sup>    |  |
|                                 | カルボプラチン |   | AUC 6                    |  |
| パージェタ<br>+トラスツズマブ<br>+ドセタキセル    | パージェタ   | DAY 1<br>(2017. 5. 15~初回のみ<br>day1パージェタ、day2ト<br>ラスツズマブ、ドセタキ<br>セル) | 840 (420)mg              | 3週1コース<br>パージェタ 初回840mg (60分)、2回目以降<br>420mg (30分)<br>トラスツズマブ 初回8mg/kg、2回目以降<br>6mg/kg                   |
|                                 | トラスツズマブ |   | 8 (6) mg/kg              |  |
|                                 | ドセタキセル  |   | 60~75 mg/m <sup>2</sup>  |  |
| パージェタ<br>+トラスツズマブ<br>+ロゼウス      | パージェタ   | DAY 1 (2017. 5. 15~初回<br>のみday1パージェタ、<br>day2トラスツズマブ、ロ<br>ゼウス)      | 840 (420)mg              | 3週1コース<br>パージェタ 初回840mg (60分)、2回目以降<br>420mg (30分)<br>トラスツズマブ 初回8mg/kg、2回目以降<br>6mg/kg                   |
|                                 | トラスツズマブ |   | 8 (6) mg/kg              |  |
|                                 | ロゼウス    | DAY 1, 8  | 25 mg/m <sup>2</sup>     |  |
| パージェタ<br>+トラスツズマブ<br>+パクリタキセル   | パージェタ   | DAY 1 (初回のみday1パー<br>ージェタ、day2トラスツズ<br>マブ、パクリタキセル)                  | 840 (420)mg              | 3週1コース<br>パージェタ 初回840mg (60分)、2回目以降<br>420mg (30分)<br>トラスツズマブ 初回8mg/kg、2回目以降<br>6mg/kg<br>パクリタキセル 連投休薬なし |
|                                 | トラスツズマブ |   | 8 (6) mg/kg              |  |
|                                 | パクリタキセル | DAY 1, 8, 15  | 80~100 mg/m <sup>2</sup> |  |
| パージェタ<br>+トラスツズマブ               | パージェタ   | DAY 1<br>(初回のみday1パー<br>ージェタ、day2トラスツズ<br>マブ)                       | 840 (420)mg              | 3週1コース<br>パージェタ 初回840mg (60分)、2回目以降<br>420mg (30分)<br>トラスツズマブ 初回8mg/kg、2回目以降<br>6mg/kg                   |
|                                 | トラスツズマブ |   | 8 (6) mg/kg              |  |

癌化学療法レジメン早見表（外科）乳がん

| 登録名                             | 投与薬剤    | 投与日          | 投与量                   | 備考   |
|---------------------------------|---------|--------------|-----------------------|--|
| カドサイラ                           | カドサイラ   | DAY 1        | 3.6mg/kg              | 3週1コース<br>初回90分、2回目以降30分   |
| エンハーツ（乳がん）                      | エンハーツ   | DAY 1        | 5.4mg/kg              | 3週1コース<br>初回90分、2回目以降30分   |
| キイトルーダ<br>+weekly PTX<br>+CBDCA | キイトルーダ  | DAY 1        | 200mg/body            | 3週1クール（最大4クール）術前<br>キイトルーダ、カルボプラチンは3週毎<br>カルボプラチンは最大750mg  |
|                                 | パクリタキセル | DAY 1, 8, 15 | 80mg/m <sup>2</sup>   |  |
|                                 | カルボプラチン | DAY 1        | AUC 5                 |  |
| キイトルーダ+<br>weekly (PTX +CBDCA)  | キイトルーダ  | DAY 1        | 200mg/body            | 3週1クール（最大4クール）術前<br>キイトルーダは3週毎<br>カルボプラチンは最大225mg  |
|                                 | パクリタキセル | DAY 1, 8, 15 | 80mg/m <sup>2</sup>   |  |
|                                 | カルボプラチン | DAY 1, 8, 15 | AUC 1.5               |  |
| キイトルーダ+EC                       | キイトルーダ  | DAY 1        | 200mg/body            | 3週1クール（最大4クール）術前   |
|                                 | エピルビシン  | DAY 1        | 90mg/m <sup>2</sup>   |  |
|                                 | エンドキサン  | DAY 1        | 600mg/m <sup>2</sup>  |  |
| キイトルーダ<br>+GEM<br>+CBDCA        | キイトルーダ  | DAY 1        | 200mg/body            | 3週1クール   |
|                                 | ゲムシタピン  | DAY 1, 8     | 1000mg/m <sup>2</sup> |  |
|                                 | カルボプラチン | DAY 1, 8     | AUC 2                 |  |
| キイトルーダ<br>+weekly PTX           | キイトルーダ  | DAY 1        | 200mg/body            | 12週1クール<br>キイトルーダ 3週毎<br>パクリタキセル4週毎  |
|                                 | パクリタキセル | DAY 1, 8, 15 | 90mg/m <sup>2</sup>   |  |
| キイトルーダ<br>+weekly アブラキサン        | キイトルーダ  | DAY 1        | 200mg/body            | 12週1クール<br>キイトルーダ 3週毎<br>アブラキサン 4週毎  |
|                                 | アブラキサン  | DAY 1, 8, 15 | 100mg/m <sup>2</sup>  |  |
| トロデルビ                           | トロデルビ   | DAY 1, 8     | 10mg/kg               | 3週1コース<br>初回3時間、2回目以降1時間<br>トロデルビ850mg以上の場合は希釈液の生食を<br>250mL→500mLへ変更<br>トロデルビ225mg未満の場合は希釈液の生食を<br>250mL→100mLへ変更 |